

เชื้อลิวมาเนียชนิด

กระจายไปที่ค่อมน้ำเหลือง ทำให้ค่อมน้ำเหลืองโตและอักเสบ ทำให้เกิดแผลเรื้อรัง ที่จมูกและปาก มีเลือดกำเดาไหล มีการอุดตันของช่องจมูก เชื้อจะทำลายเนื้อเยื่อเกิดเป็นแผลอักเสบ มีไข้ ซีด อ่อนเพลีย น้ำหนักลด และมีความพิการเกิดขึ้นได้ เชื้อลิวมาเนียชนิดที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงที่เรียกว่าโรคคาลาอะซาร์ (Kala-azar) เชื้อจะกระจายไปยังตับ ม้าม ไช้กระดูก ค่อมน้ำเหลือง และทุกอวัยวะของร่างกาย อาการสำคัญเริ่มด้วยมีไข้สูง หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ค่อมน้ำเหลืองโต ตับและม้ามโต มีอาการอุจจาระร่วงร่วมด้วย อาจมีเลือดออกจากจมูก ไร้น้ำ มีจุดเลือดออกตามตัว ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ บางรายอาจถึงตายได้ เนื่องจากผลติดเชื้อ หรือมีการอุดตันของทางเดินหายใจ



การป้องกัน

โรคลิวมาเนียยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกัน ต้องระวังดูแลตนเองไม่ให้ถูกแมลงกัด สำหรับคนไทยที่กลับจากการทำงาน หรือกำลังทำงาน อยู่ในแถบตะวันออกกลาง เมื่อพบว่ามีแผลบวมแดงขึ้นบริเวณร่างกาย นอกर्मผ้าหรือปรากฏ อาการอื่นๆดังกล่าวข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจและรักษาที่ถูกต้อง



โรคลิวมาเนีย (LEISHMANIASIS)



กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
Tel. 0-2590-3232-5
<http://thaigcd.ddc.moph.go.th>